

# SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 2019

## PŠENICE OZIMÁ

Se zvyšujícími se pěstitelskými plochami přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizeň v podmínkách ekologického hospodaření. Avšak informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém režimu v podmínkách ČR dosud chyběla. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR na jaře roku 2015 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pověřen organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení:

- **předběžně doporučené** - odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,
- **doporučené** - odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení,
- **odrůdy ostatní** - odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí se zakládají od podzimu 2015. Do pokusů vstoupilo celkem devět odrůd. Tříleté výsledky zkoušení, které jsou podmínkou pro doporučení, jsou k dispozici u odrůd Annie, Balitus, Bernstein, Gordian, Penelope, Sultan a Zeppelin. U odrůdy Cimrmanova raná bylo po sklizni 2017 ukončeno zkoušení. V roce 2018 byl sortiment rozšířen o odrůdu RGT Sacramento.

Infekční tlak chorob byl ve sledovaném období středně vysoký až nízký. Odrůdové rozdíly byly hodnotitelné u **rzi pšeničné** (hnědé rizivosti pšenice), kde se potvrdila odolnost odrůdy Gordian.

V souvislosti se změnami rasového spektra rzí však může dojít k překonání odolnosti a může se případně měnit. **Listové skvrnitosti** hrály významnější roli v roce 2016, nejvíce byla napadená odrůda Cimrmanova raná. Mezi ostatními odrůdami nebyly zjištěny zřetelné rozdíly. Napadení **padlím travním** (padlím pšenice) bylo ve sledovaných pokusech nízké, bez odrůdových rozdílů. **Poléhání** se vyskytlo pouze v roce 2017 v Uhřetěvesi, kde se potvrdila menší odolnost proti poléhání odrůdy Cimrmanova raná. Hodnocení **odolnosti proti vymrzání** vychází z testů prováděných v umělých podmínkách (bedny umístěné 1 m nad zemí, mrazové boxy a mrazové komory). Nejvyšší odolnost má odrůda Zeppelin. Problémy s přežitím rostlin při výskytu silných holomrazů můžeme očekávat u odrůd Sultan a Bernstein.

Uváděné zařazení zkoušených odrůd do kategorií pekařské jakosti vychází z testování v konvenčních podmínkách v rámci řízení o registraci odrůdy. Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství byly provedeny základní technologické rozборы. **Obsah dusíkatých látek v sušině** a **obsah mokrého lepku** korespondoval s úrovní výživy pokusů (předplodina, bonita půdy, ...) a potvrdila se nepřímá úměra mezi výnosy a obsahem dusíkatých látek. Mírně vyšší úroveň měly odrůdy elitní (E) jakosti Bernstein a Annie, naopak nižší obsah dusíkatých látek byl hodnocen u odrůdy chlebové (B) jakosti Gordian. Hodnota **Zeleného sedimentačního testu**, která je silně geneticky vázaná, byla opět vyšší u odrůd elitní jakosti a u odrůdy Zeppelin. Tato odrůda však měla nižší obsah mokrého lepku. **Objemovou hmotnost** a **číslo poklesu** výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány ve sklizňovém roce 2016, kdy bylo v průběhu sklizně deštivé počasí.

## VÝNOS ZRNA DLE LOKALIT

Rok zkoušení	2016			2017			2018			Průměr 2016 - 2018	
Lokalita	Postřelmov	Uhřetěves	Průměr	Uhřetěves	Zvíkov	Průměr	České Budějovice	Uhřetěves	Zvíkov		Průměr
Předplodina	jetel luční	vikev setá		jetel luční	svazenka, hrách, ovčí hnůj		peluška	jetel luční	svazenka, hrách, hnůj		
Výsevek (MKS)	4,5	4,0		5,0	5,5		5,0	5,0	5,0		
Datum setí	30. 9.	12. 10.		18. 10.	18. 10.		1. 10.	16. 10.	2. 10.		
Datum sklizně	26. 7.	4. 8.		1. 8.	3. 8.		20. 7.	18. 7.	25. 7.		
<b>Výnos zrna (t.ha<sup>-1</sup>)</b>											
<b>Sultan</b>	4,81	8,16	<b>6,49</b>	9,38	4,46	<b>6,92</b>	3,83	5,57	4,39	<b>4,60</b>	<b>6,00</b>
<b>Gordian</b>	4,31	8,54	<b>6,43</b>	10,22	4,38	<b>7,30</b>	2,75	4,45	5,04	<b>4,08</b>	<b>5,94</b>
<b>Zeppelin</b>	3,89	7,47	<b>5,68</b>	9,88	3,66	<b>6,77</b>	3,28	6,33	5,42	<b>5,01</b>	<b>5,82</b>
<b>Bernstein</b>	5,13	7,34	<b>6,24</b>	9,36	3,69	<b>6,53</b>	2,85	5,19	5,44	<b>4,49</b>	<b>5,75</b>
<b>Penelope</b>	4,17	8,72	<b>6,45</b>	9,60	3,73	<b>6,67</b>	2,44	4,72	5,03	<b>4,06</b>	<b>5,72</b>
<b>Annie</b>	4,95	7,46	<b>6,21</b>	9,00	3,66	<b>6,33</b>	3,56	5,53	4,70	<b>4,60</b>	<b>5,71</b>
<b>Balitus</b>	4,13	7,09	<b>5,61</b>	9,75	3,14	<b>6,45</b>	2,75	4,66	4,60	<b>4,00</b>	<b>5,35</b>
MD 0.05	0,65	0,52	<b>1,49</b>	0,27	0,30	<b>0,96</b>	0,34	0,33	0,49	<b>0,83</b>	<b>0,63</b>
<b>Výnos zrna (%)</b>											
<b>Sultan</b>	107	104	<b>105</b>	98	117	<b>103</b>	125	107	89	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>Gordian</b>	96	109	<b>104</b>	106	115	<b>109</b>	90	85	102	<b>93</b>	<b>103</b>
<b>Zeppelin</b>	87	95	<b>92</b>	103	96	<b>101</b>	107	122	110	<b>114</b>	<b>101</b>
<b>Bernstein</b>	114	94	<b>101</b>	98	97	<b>97</b>	93	100	110	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>Penelope</b>	93	111	<b>105</b>	100	98	<b>99</b>	80	91	102	<b>92</b>	<b>99</b>
<b>Annie</b>	110	95	<b>101</b>	94	96	<b>94</b>	116	106	95	<b>104</b>	<b>99</b>
<b>Balitus</b>	92	91	<b>91</b>	102	82	<b>96</b>	90	89	93	<b>91</b>	<b>93</b>
Průměr všech odrůd	<b>4,48</b>	<b>7,83</b>	<b>6,16</b>	<b>9,60</b>	<b>3,82</b>	<b>6,71</b>	<b>3,07</b>	<b>5,21</b>	<b>4,95</b>	<b>4,41</b>	<b>5,76</b>
MD 0.05 v %	14	7	<b>24</b>	3	8	<b>14</b>	11	6	10	<b>19</b>	<b>11</b>

## VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

Kategorie doporučení		Předběžně doporučená						Ostatní
Pekařská jakost		A	B	A	E	A	E	A
	Prům. všech odrůd (t.ha <sup>-1</sup> )	<b>Sultan</b>	<b>Gordian</b>	<b>Zeppelin</b>	<b>Bernstein</b>	<b>Penelope</b>	<b>Annie</b>	<b>Balitus</b>
Výnos zrna (%)	5,76	104	103	101	100	99	99	93
Agronomická data	Metání - rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech	147	3	0	2	2	-1	-3
	Zralost - rozdíl od odrůdy Sultan ve dnech	202	1	0	2	0	-1	-1
	Délka rostlin (cm)	85	68	79	90	81	80	73
	Počet produktivních stébel na m <sup>2</sup>	374	346	374	354	354	352	348
	Odolnost proti vymrzání - testy (%)	64	76	89	61	78	78	79
Odolnost proti chorobám (9-1)	Hnědá rzivost pšenice (rez pšeničná)	6	8	7	7	7	6	5
Kvalita zrna	Sedimentační test Zelený (ml)	29	24	38	37	33	34	30
	Obsah dusíkatých látek v sušině (%)	11,1	10,3	10,9	11,5	10,8	11,5	10,9
	Číslo poklesu (s)	269	341	351	329	284	295	313
	Objemová hmotnost (kg.hl <sup>-1</sup> )	76,0	74,9	77,5	78,6	75,5	78,6	74,5
	Obsah mokrého lepku (%)	20	19	17	22	20	23	21
	Hmotnost 1000 zrn (g)	42	38	42	44	43	46	42
Morfologická charakteristika	Vzdál. praporcového listu a klasu (mm)	137	82	92	122	122	121	100
	Délka praporcového listu (mm)	177	139	144	141	141	163	141
	Šířka praporcového listu (mm)	14	18	14	14	16	15	14
	Délka klasu (mm)	86	87	94	90	83	81	77
	Počet zrn v klasu - laboratoř	41	54	45	45	47	40	42
Rok registrace		2008	2014	2013	2015	2016	2014	2015

Pekařská jakost: E - elitní, A - kvalitní, B - chlebová, C - nevhodná pro pekařské využití  
 Bodové hodnocení: 9 = nepoléhavá, odolná proti napadení; 1 = zcela poléhavá, náchylná k napadení.

## ANNIE<sup>PO</sup>

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Středně raná osinatá odrůda elitní (E) jakosti, rostliny středně vysoké, méně odnožující, zrno velké.

Přednosti:	Vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika:	Výrazná nemá.
Udržovatel:	SELGEN, a.s.
Zástupce v ČR:	SELGEN, a.s.

## BALITUS<sup>CPG</sup>

OSTATNÍ

Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti, rostliny středně vysoké až nízké, méně odnožující, zrno středně velké.

Přednosti:	Ranost.
Pěstitelská rizika:	Nízká objemová hmotnost, menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou (hnědou rzivostí pšenice).
Udržovatel:	Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Rakousko
Zástupce v ČR:	SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

## BERNSTEIN<sup>CPG</sup>

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Polopozdní až pozdní odrůda elitní (E) jakosti, rostliny vysoké, méně odnožující, zrno středně velké.

Přednosti:	Stabilní číslo poklesu, vysoký obsah dusíkatých látek, vysoká objemová hmotnost.
Pěstitelská rizika:	Malá odolnost proti vymrzání.
Udržovatel:	Syngenta Hadmersleben GmbH, Německo
Zástupce v ČR:	B O R, s. r. o.

## GORDIAN<sup>CPG</sup>

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Polopozdní odrůda chlebové (B) jakosti.

Rostliny nízké, méně odnožující, zrno malé.

Přednosti:	Odolnost proti napadení rzí pšeničnou (hnědou rzivostí pšenice).
Pěstitelská rizika:	Nízký obsah dusíkatých látek, nízká objem. hmotnost.
Udržovatel:	Syngenta Participations AG, Švýcarsko
Zástupce v ČR:	B O R, s.r.o.

## PENELOPE<sup>CPG</sup>

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti. Rostliny středně vysoké, méně odnožující, zrno středně velké.

Udržovatel:	SELGEN, a.s.
Zástupce v ČR:	SELGEN, a.s.

## SULTAN<sup>PO</sup>

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.

Udržovatel:	SELGEN, a.s.
Zástupce v ČR:	SELGEN, a.s.


## ZEPELIN<sup>CPG</sup>

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ

Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti, rostliny středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.

Přednosti:	Odolnost proti vymrzání, vysoká objemová hmotnost.
Udržovatel:	Syngenta Hadmersleben GmbH, Německo
Zástupce v ČR:	B O R, s.r.o.

## VÝNOSY ZRNA 2016 - 2018 (%)



## PŘIHLÁŠENÉ MNOŽITELSKÉ PLOCHY PŠENICE OZIMÉ V EKOLOGICKÉM REŽIMU PĚSTOVÁNÍ 2008 - 2018 (ha)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alka	11	6	5				14		17		
Angelus											21
Annie								27	15	10	19
Aszita							2	24	14	13	16
Balitus											6
Bardotka						20					
Bohemia		9	37	15	35	10	33	41			
Bonanza									6		20
Capo	19	9									
Citrus				14							
Diadem							10		17	11	23
Dromos				10		9	15	8	6	8	
Ebi	10										
Elly				11	14						
Eurofit		9	25								
Frisky											5
Genius								16	10		
Landsknecht										6	
Lukullus											10
Penalta					14	14	9	24	22	29	28
Penelope										14	41
Raduza					12	27					
Rapsodia	10						14				
Rivero											14
Sakura		31	35								
Scaro						4	11	9	11	24	22
Simila	22	51		23		11					
Sultan		10		15	30	10		17		25	24
Tengri							3	13	6	14	11
Tobak							3				
Wiwa									7	27	24
<b>Celkem</b>	<b>72</b>	<b>125</b>	<b>102</b>	<b>87</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>178</b>	<b>131</b>	<b>182</b>	<b>284</b>

## METODIKA ZALOŽENÍ A VEDENÍ POKUSŮ

Hodnocení odrůd pšenice ozimé vychází z výsledků pokusů prováděných v letech 2016 - 2018 podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém režimu pěstování. Odrůdy byly vysety na parcelách se sklizňovou plochou 10 m<sup>2</sup> ve 4 opakováních se znárodněným pořadím odrůd (úplně znárodněné bloky) na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Ošetřování během vegetace odpovídalo zásadám ekologického pěstování tj. bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky - vláčením prutovými branami - dle konkrétních podmínek zkušební lokality. Dosažené výnosy byly statisticky vyhodnoceny. Pokusy, u kterých byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.), nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Ze sklizně byly odebrány vzorky a byly provedeny kvalitativní rozborů zrna.



## CHARAKTERISTIKA ZKUŠEBNÍCH LOKALIT

Výnosovou úroveň pokusů nejvíce ovlivnily půdně-klimatické podmínky lokality, předplodina a termín setí. Nejvyšších výnosů dosahovaly pokusy v Uhříněvsi, kde je kvalitní, úrodná půda a dlouhodobě zavedený osevní postup s vyšším podílem zlepšujících plodin. Na druhé straně je lokalita České Budějovice, kde je limitujícím faktorem extenzivní písčitohlinitá půda.

Infekční tlak houbových chorob je v porostech v režimu ekologického pěstování obecně nižší než v konvenčně vedených porostech, což se potvrdilo i v odrůdových pokusech. Menší hustota porostu vytváří mikroklima nepříznivá pro šíření patogenů.

Lokalita	Výrobní oblast	Nadmořská výška (m)	Dlouhodobá průměrná teplota (°C)	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek (mm)	Půdní typ a druh
České Budějovice	obilnářská	388	8,5	627	Pseudoglej typický - písčitohlinitá (střední)
Kujavy	obilnářská	370	8,2	604	Luvizem typická - hlinitá (střední)
Ruzyně	řepařská	345	7,9	472	Černozem typická - hlinitá (střední)
Uhříněves	řepařská	295	8,3	575	Hnědozem typická - jílovitohlinitá (těžká)
Postřelmov	řepařská	300	7,5	650	Hnědozem luvizemní - hlinitá (střední)
Velké Hostěradky	řepařská	215	8,9	559	Hnědozem luvizemní - písčitohlinitá (střední)
Zvíkov	obilnářská	490	7,2	634	Hnědozem luvizemní - hlinitá (střední)

## PUBLIKACE BYLA PROJEDNÁNA A SCHVÁLENA ODBORNOU KOMISÍ PRO DOPORUČENÍ ODRŮD

Členové Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství:

Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.  
Ing. Vladimíra Horáková  
Ing. František Chlad  
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.  
Doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.  
Mgr. Pavlína Samsonová  
Ing. Zdeněk Stehno, CSc.  
Ing. Petr Trávníček

Národní odrůdový úřad děkuje za odbornou a technickou spolupráci při tvorbě této publikace:



PRO-BIO  
Svazu ekologických  
zemědělců



© Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně,  
Národní odrůdový úřad, Brno 2018

*Tato publikace nesmí být přetiskována vcelku nebo po částech, uchovávána v médiích, přenášena nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez povolení ÚKZÚZ.*

ISBN 978-80-7401-167-2